

Tegen brandnetels in gras



Voldoende voor ruim 160 m² (50 ml)

Voldoende voor ruim 2700 m² (850 ml)

*Dosering: zie
gebruiksaanwijzing*

Werkzame stoffen: Mecoprop-P

Gehalte: 600 g/l

ALGEMEEN

Duplosan MCPP is een selectief bladherbicide op basis van de groeistof mecoprop-p dat een aantal tweezaadlobbige overblijvende en éénjarige onkruiden bestrijdt. Duplosan MCPP heeft een goede werking op brandnetels, muur en ridderzuring. Bij pleksgewijze toepassing dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt van een afschermkap om contact van de spuitvloeistof met bomen, struiken of andere gewassen te vermijden. Het onkruid goed bevochtigen, echter met dien verstande dat de vloeistof niet van de planten afdruipt

GEBRUIKSAANWIJZIGING

WEILANDEN

a. Tegen ridderzuring.

Toepassen in het volle rozetstadium tot het begin van het doorschieten van de bloemstengels; eventueel ook in de zomer mits voldoende blad aanwezig is.

Dosering: 30ml oplossen in 5-10L water voor 100 m². Bij pleksgewijze bestrijding dient te worden gespoten met een concentratie van 0,5% (50 ml in 10L water.)

b. Tegen grote brandnetel.

Toepassen bij een hoogte van de grote brandnetelpollen van 15-20 cm en wanneer zij in goede groei verkeren. Ook kan men eerst de pollen afmaaien en na opnieuw uitlopen een bespuiting uitvoeren.

Dosering: 30 ml oplossen in 5-10L water voor 100 m². Bij pleksgewijze bestrijding dient te worden gespoten met een concentratie van 0,5% (50 ml in 10L water.)

c. Tegen muur.

Uitsluitend toepassen wanneer het gras onder de muur dreigt te verstikken en bij voorkeur in het voorjaar. In het voorjaar is een bespuiting alleen mogelijk in een periode met zacht weer en wanneer niet binnen enkele dagen vorst te verwachten is. Aanwezige klaver wordt door dit middel gedood.

Dosering: in pas ingezaaid gras 10-15 ml per 5-10L water voor 100 m²; in ouder weiland 20 ml oplossen in 5-10L water voor 100 m².

De dieren moeten tijdens het spuiten en gedurende tenminste 28 dagen er na uit de weide worden gehouden.

ATTENTIE

Het beste resultaat wordt verkregen als men spuit bij zacht, groeizaam weer, een bedekte lucht en op een droge vegetatie. Het middel moet door de planten worden opgenomen voor een goede werking; daarom moet het na toepassing minstens 6 uur droog blijven. Overwaaien van de vloeistof op andere gewassen moet beslist worden voorkomen; vruchtenbomen, groenten, etc. zijn zeer gevoelig. Daarom uitsluitend pleksgewijs verspuiten op die plaatsen waar de onkruiden overlast veroorzaken. Spuit met een grove druppel, onder lage

druk en met gebruikmaking van een spuitkap. Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water reinigen.

Bereiding spuitvloeistof

De te gebruiken hoeveelheid middel dient bij het water te worden gegoten en niet omgekeerd.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:

- a. in weilanden waarin geen dieren aanwezig zijn;

Veiligheidstermijn

In weilanden niet korter dan 28 dagen voor de beweiding toepassen.

Het middel niet toepassen voor 1 maart en na 1 september.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



DCM Nederland B.V. – Valkenburgseweg 62-a – 2223 KE Katwijk. www.luxan.eu